

### Wanneer moet u contact opnemen met de praktijk?

Heeft u veel last, nabloedingen of krijgt u koorts (38,5 graden of hoger)? Krijgt u overgevoelighedsverschijnselen zoals jeuk en huiduitslag van uw antibioticum? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 071-3660650.

Ook als u zich zorgen maakt kunt u altijd contact opnemen. Buiten openingstijden van de praktijk kunt u contact opnemen met ons mobiele telefoonnummer.



*De rijke historie van de Cleyburch is gecombineerd met een moderne en vriendelijke uitstraling die past bij een tandartspraktijk van deze tijd. Er zijn verschillende praktijken in de Cleyburch gevestigd.*

*De praktijk is van alle gemakken voorzien en biedt voldoende parkeergelegenheid voor haar bezoekers. Ook is de praktijk rolstoeltoegankelijk.*

*Alle facetten binnen de tandheelkunde komen bij de verschillende praktijken van Cleyburch tandartsen aan bod, zoals implantologie, kindertandheelkunde, gebitsslijtage en mondhygiëne.*

## Implantologie

### Alles over het plaatsen van een implantaat als basis voor uw kroon of brug


*Cleyburch Tandartsen. Gezond voor uw mond.*

U mist een tand of kies die vervangen gaat worden door een kroon. Om deze te kunnen bevestigen, is een implantaat nodig. Een implantaat is een soort schroef, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium, die wij onder plaatselijke verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Het implantaat vervangt uw ontbrekende tandwortel en biedt zo houvast voor uw kroon. Over het algemeen zal uw kroon niet van uw eigen tanden te onderscheiden zijn. Het resultaat: een sterke, natuurlijk uitziende tand of kies!



# Alles over het plaatsen van een implantaat als basis voor uw kroon of brug.

U mist een tand of kies die vervangen gaat worden door een kroon of brug. Om deze te kunnen bevestigen, is een implantaat nodig. Een implantaat is een soort schroef, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium, die wij onder plaatselijke verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Er moet natuurlijk genoeg bot aanwezig zijn om het implantaat stabiel in uw kaak te kunnen plaatsen. Mocht dit bij u niet het geval zijn, dan zou het nodig kunnen zijn om het implantaat te plaatsen in combinatie met het verbreden van het bot. In enkele gevallen zal eerst alleen het bot verbreed moeten worden voorafgaand aan het implanteren. Het implantaat vervangt uiteindelijk uw ontbrekende wortel en biedt zo houvast voor uw kroon of brug. Over het algemeen zal u kroon of brug niet van echt te onderscheiden zijn. Het resultaat: een sterke, natuurlijk uitziende tand of kies!



## Pijnstilling en antibioticum ter voorbereiding op de ingreep

- Pijnstilling: neem 1 uur voor aanvang van de ingreep 1 tablet Diclofenac. Dit middel verzacht de pijn op het moment dat de verdoving uitwerkt en het werkt tevens ontstekingsremmend.
- Antibioticum: neem 1 uur voor de ingreep alle tabletten amoxicilline 3 gram (waarschijnlijk 6 tabletten van 500 mg) tegelijk in.
- Heeft u een recept voor de maagbeschermer Omeprazol ontvangen? Dan neemt u eenmaal per dag 1 tablet, alleen als u die dag ook Diclofenac gebruikt.

Sommige patiënten moeten ook een ander antibioticum nemen naar aanleiding van deze behandeling. Heeft u recepten gekregen voor een kuur van amoxicilline 500 mg met 21 tabletten? Neem dan de avond voor de behandeling 1 tablet en daarna driemaal daags 1 tablet. Lees goed de bijsluiter en maak de gehele kuur af. Alle medicijnen kunt u ophalen bij uw eigen apotheek, op vertoon van de recepten die u van ons heeft meegekregen.

## De behandeling

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer drie kwartier tot anderhalf uur. Na de behandeling krijgt u een coldpack om uw gezicht mee te koelen. Houd deze gedurende driekwartier tegen uw gezicht. Dit is belangrijk, want dat vermindert de zwelling en de eventuele napijn. Wanneer ook het bot verbreed is, kan er naast zwelling ook een blauwe plek ontstaan.

## Pijnbestrijding en antibioticum na de operatie

De napijn valt over het algemeen erg mee. Heeft u toch last, dan is dit goed te onderdrukken met het recept Diclofenac dat u van ons heeft meegekregen. Neem maximaal 3 tabletten per dag en neem alleen de medicijnen als u nog pijn heeft. Heeft u een recept gekregen voor een kuur amoxicilline 500 mg met 21 tabletten? Lees dan goed de bijsluiter en maak de gehele kuur af.

## Niet poetsen, wel spoelen

Om het geopereerde gebied in uw mond rust te gunnen, mag u twee weken lang op die plek niet poetsen. De rest van uw gebit kunt u wel gewoon poetsen. Om de geopereerde plek toch schoon te houden, heeft u van ons een recept gekregen voor een mondspoelmiddel (chloorhexidine). Hier moet u vanaf de dag na operatie tweemaal per dag uw mond mee spoelen. Dit doet u gedurende twee weken. De eerste 24 uur na de ingreep mag u uw mond niet spoelen!

## Hechtingen verwijderen en nacontrole

Een tot twee weken na de ingreep komt u naar de praktijk om de hechtingen te laten verwijderen. Ook controleren we uiteraard of de wond goed geneest. Ongeveer 2 tot 3 maanden nadat de implantaten zijn geplaatst, komt u weer terug voor controle. Er wordt dan een röntgenfoto gemaakt. Aan de hand daarvan kan de implantoloog zien of de implantaten mooi zijn ingegroeid. U hoort dan gelijk wanneer u een afspraak kunt maken voor het plaatsen van de kroon of brug. Dit kan bij uw eigen tandarts of bij ons in de praktijk.